

PRUŽANJE PRVE POMOČI

U slučaju nesreće protiv tebe utvrditi, da li je ugrožen čovjek.


Osnovni znakovi osobe na životu:

- kretanje
- rad srca (krvotok)
- disanje
- govor

Pregled rana srca: na ruci, iznad zgloba dodirujemovenu kavicu da bismo osjetili krvo tok (arterni puls), koji treba dodirnuti uvijek s četiri prsta (slika 1). U slučaju ozbiljnijeg krvotoka čak 3-4 prstima tiri marađandakrvošni rešikaj. Svr kompreszist csak szakember végezhet.

Pregled rana srca: na ruci, iznad zgloba dodirujemovenu kavicu da bismo osjetili krvo tok (arterni puls), koji treba dodirnuti uvijek s četiri prsta (slika 1). U slučaju ozbiljnijeg krvotoka čak 3-4 prstima tiri marađandakrvošni rešikaj. Svr kompreszist csak szakember végezhet.

Pregled disanja: u normalnim okolnostima ritam disanja je 16-20/minut. Kod disanja grudni koš i rebra ritmički se podižu i se slegne, rad možemo učinkovito ustanoviti promatranji i te sa strane.



1. slika
Puls iznad zlobo

Krvarenje iz vene kavicu je peškie vena kavicu, iz rane, izotvoreno sa radom rana, abranu se dijelja vaskulizovana krv, ritmički koja je isporučena sa radom rana. (slika 3).


Zdravljanje: uzvratit kompreszist zavoj. S prilikom prsta privremeno zavojomjavo krvarenje tamo gdje vena kavicu možemo prisiti na kosti. Ranu treba tamponirati sa sterilnom gazom.



2. slika
Puls iznad zlobo

Krvarenje iz vene kavicu je peškie vena kavicu, iz rane, izotvoreno sa radom rana, abranu se dijelja vaskulizovana krv, ritmički koja je isporučena sa radom rana. (slika 3).

Zdravljanje: uzvratit kompreszist zavoj. S prilikom prsta privremeno zavojomjavo krvarenje tamo gdje vena kavicu možemo prisiti na kosti. Ranu treba tamponirati sa sterilnom gazom.




3. slika
Krvarenje iz vene kavicu

Rana: ukoliko površina kože, zbog vanjskog utjecaja bude prekinuta i s vnom kontinuitetu, rana krvavi, bol. Osnovno je za učitati zbrinuti rana. Oko ili do koje kod rane očišćamo tako i se za pripravitu očišćanje potom od rane prema vani, nakon toga isto jednoliko. Glavni ampuje glave odolimo, sa jednom ili s objinovanjem. Rana natopio gaza, i se jednoritmično obrišemo oko ili do rane. Kod zbrinjavanja same rane koristimo folijnu kavicu (krvotok rane nista sterilu).

Kod rana koji su izazvani kiselom ili alkalnom, potrebno je potrebno odrediti odojdu koja je nastojela kiselom, sa puno čiste vode rana isprati, i nakon toga ranu zavazati sterilnom gazom. Kiselom koja je dospjela u oko treba kontinuirano ispirati s čišom vodom tijekom 15-20 minuta.


Pružanje pomoći kod opeklinu: pokojno opjevit dio sa sterilnom gazom. Kod opeklinu veličku površinu unesrećom unemo u svježe izgladnalu platu, odjevo nemojno isprati. Opeklinu na licu uvijek pokrijemo sterilnom gazom. Učinkovito je kod ovakvih ozljeda dodatno koristiti 3-5-klit kalicu popiti.



4. slika
Iščešnje

Prelom noge: prelom može biti zatvoren ili otvoren. Simptomi: bol, oteklinu. Kod otvorenih preloma koža kod krvava kostiju krvavi. Ranu treba zbrinuti na vez predhodno očišćanje (slika 6).


Zbrinjavanje leoma: fiksiranje u položaju kako smo zatekli ozlojednog koristećim šinu (slika 7).



5. slika
Iščešnje

Prelom noge: prelom može biti zatvoren ili otvoren. Simptomi: bol, oteklinu. Kod otvorenih preloma koža kod krvava kostiju krvavi. Ranu treba zbrinuti na vez predhodno očišćanje (slika 6).

Zbrinjavanje leoma: fiksiranje u položaju kako smo zatekli ozlojednog koristećim šinu (slika 7).



6. slika
Završetak otvorenog prijeloma

Ozljeda glave i mozga: nam kosti lubanje, zbog mogućnosti ozljede mozga, spada u kategoriju teških ozljeda. Simptomi: gubitak svijesti, amnezija, glavobolja, vrtoglavica, nagon za povraćanjem, povraćanje, preplani perion gubika vida i slaba.

Zbrinjavanje: unesrećnik s ozlojedom glave do dolaska hitne pomoći se polegao sa malo uzdignutom glavom. Unesrećnog bez svijesti treba namjestiti u bočni položaj (slika 8).

Unesrećnog s teškom ozlojedom grudnog koša, klime, kuka ili prijeloma nadokolice treba postaviti u ležeci položaju glavom okrenutu na lijevu stranu, ukoliko povratni, donja vilica treba naginuti prema naprijed. Ispravnica namna treba obristati za usta. Zabrano je pomicanje unesrećnog.



7. slika
Postavljanje šine kod preloma ekstremiteta

Prelom noge: prelom može biti zatvoren ili otvoren. Simptomi: bol, oteklinu. Kod otvorenih preloma koža kod krvava kostiju krvavi. Ranu treba zbrinuti na vez predhodno očišćanje (slika 6).

Zbrinjavanje leoma: fiksiranje u položaju kako smo zatekli ozlojednog koristećim šinu (slika 7).




8. slika
Završetak otvorenog prijeloma

Ozljeda glave i mozga: nam kosti lubanje, zbog mogućnosti ozljede mozga, spada u kategoriju teških ozljeda. Simptomi: gubitak svijesti, amnezija, glavobolja, vrtoglavica, nagon za povraćanjem, povraćanje, preplani perion gubika vida i slaba.

Zbrinjavanje: unesrećnik s ozlojedom glave do dolaska hitne pomoći se polegao sa malo uzdignutom glavom. Unesrećnog bez svijesti treba namjestiti u bočni položaj (slika 8).


Unesrećnog s teškom ozlojedom grudnog koša, klime, kuka ili prijeloma nadokolice treba postaviti u ležeci položaju glavom okrenutu na lijevu stranu, ukoliko povratni, donja vilica treba naginuti prema naprijed. Ispravnica namna treba obristati za usta. Zabrano je pomicanje unesrećnog.



9. slika
Half sitting position

Reanimation: if breathing and circulation stop, resuscitation must immediately be started, as the brain can only tolerate the oxygen-deficient state without permanent damage for 4 to 4 minutes. Heart compression should only be performed by a professional person.

When breathing stops, the injured person is laid down on a flat and hard ground. If a respiratory system is closed (Figure 10). Taking the head at the limit line of the forehead and the hairy skin, it is bent back and the lower jaw bone pressed against the upper one with the fingers (Figure 11). The respiratory system will be opened this way.



10. slika
Closed respiratory system

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.



11. slika
Free respiratory system

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:


- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.



12. slika
Free respiratory system

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.



13. slika
Free respiratory system

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Free respiratory system: If blowing in, it must be continued until:

- a physician arrives at the scene,
- signs of death can be observed on the injured person,
- arrival of the rescue team,
- breathing and circulation are restored.

Poskytovani první pomoci

Prí nehode je nutné určiť, aká žije osoba, ktorá měla nehodu.


Základní známky života:

- pohyb
- srdeční rytmus (cirkulace)
- dýchání
- řeč


Kontrola srdečního rytmu: při zápalu nad kosti radius můžeme namáhnat puls. Kontrola vždy dít se 4 prsty. (obrázek 4.1).

Když puls je nenamáhateľný, je třeba hladať teplotu. (obrázek 4.2). Prí ľavej alebo pravej strane hlava sa namáha puls se týpní prsty.

Kontrola dýchání: normální rytmus je 16-20/minúť. Prí dýchání se hrudník a břicho se rytmičky zdvíná, resp.klesá. Z pokus o nejľahšie nospáť.



Obrázek 4.1
Puls při zápalu



Obrázek 4.2
Krvit teplota

Arteriální krvávení: pípápe, že praskne tepna, z rány začne vytékat; pulzujícími charakterem li světo-červení krev. (obrázek 4.3).

Postup: přiložit tlakový obvaz. Dostavím tlakem prstí můžeme krvávení krvávení omazít tak, že začítíme nam, kde a to slátn hlávku arterie ke kosti. Rana musí být očištěná se sterilnou gázou.



Obrázek 4.3
Uzávěrné dýchací cesty

Funkční vzduchu: Zhuboka se nadýchnete a vyfouknete vzduch do jeho nosu. Postiženému nechte ústa zavřená (spodní čelist tlakově i horními). Nechte postiženého, aby si vydechoval sám z úst vzduch. Funkční vzduchu je třeba opakovat až 6-20 krát za minutu.

Se Spasnou fookal technikou se může žaludek nafouknout a mohou vyvolat zvracení. V tomto případě postiženého očistěte nosku, a zvraky by měli být odstraneny z jeho úst.


Funkční vzduchu může vykonávat do dle, když:

- na nisku nedostatek dýchání,
- nepou máme zánaky smrti na postiženém,
- pobytovost službu dožad,
- dýchání i křečmi obě se neodvzí.


Výskložená: výprade vnějši nadměrní síly se klob vysme ze své pozice a nevrátí se do původní polohy, tak dypke k vyškložení. (obrázek 4.4).

Příznaky: bolest, otek, deformace.

Postup: zavřofovat kľovky (obrázek 4.5).




4.5. slika
Zavřofovat kľovky



Obrázek 4.6
Vykľožená

Zlominy: roznoževné otvorené a uzavřené. Příznaky: bolest, otek. U uzavřené zlomeniny kosti poraněná kůže a dojde ke krváčení. Rana může oteřtí dle dřívé uvedeného principu. (obrázek 4.6).


Postup při zlomenině: upřít, zavřofovat zlomenou část těla. (obrázek 4.7).




Obrázek 4.7
Zavřofování zlomeniny

Obrazek 4.6
Otvřená a uzavřená zlomenina
Poranění kľovky a moku: otvorené otvorené a uzavřené. Příznaky: bolest, otek. U uzavřené zlomeniny kosti poraněná kůže a dojde ke krváčení. Rana může oteřtí dle dřívé uvedeného principu. (obrázek 4.6).


Postup při zlomenině: upřít, zavřofovat zlomenou část těla. (obrázek 4.7).




Obrazek 4.8
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.9
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.10
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.11
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.12
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.13
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.14
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.15
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.16
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.17
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.18
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.19
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.20
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.21
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.22
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.23
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.24
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.25
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.26
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.27
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.28
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.29
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.30
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.31
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.32
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.33
Zavřofování zlomeniny




Obrazek 4.34
Zavřofování zlomeniny



Obrazek 4.35
Zavřofování zlomeniny

Zranení kľovky: Příznaky: bolest při dýchání, která je povrchová, rychlí. Postup: poraněný by měl být posazen do polosedu (obrázek 4.9), jeho těsný oděv je nutné uvolnit.



Obrazek 4.9
Posazení do polosedu



Obrazek 4.10
Posazení do polosedu

Reanimace: okamžitě je nutné začít s reanimací, když se zastaví dýchání, nebo krevní oběh, protože mozek bytby kľovky vydrží jenom 3-4 minuty, aby si došlo k tvrdému pokřovení. Pouze kvalifikovaní personál by měl provádět rešití komprese.

Pokud došlo k zástavě dýchání, očištie postieženého na zádu, nejľahšie na tvrdý, rovný povrch. Dýchací cesty jsou uzavřené. (obrázek 4.10). Celu uchopíme svou pravou rukou a přetřeme ho nahoru, a